

Tels sont les résultats généraux de ma campagne d'août-septembre 1896. Ils sont, comme on le voit, des plus encourageants et méritent d'être poussés très activement.

QUATRE ESPÈCES NOUVELLES DE COLÉOPTÈRES (FAMILLE DES CICINDÉLIDES)
DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS,

PAR LE D^r WALTHER HORN (DE BERLIN).

Tetracha angusticollis : differt a *T. fulgida* Klg. (forma minore : *Mellyi* Chd.) magnitudine minore; thorace angustiore, antice minus dilatato, angulis anterioribus non explanate incurvis, sulcis superioribus levioribus, margine apicali basaliq. brunneo; humeris magis rotundatis; elytris paullo sparsius punctatis, apice singulo minus rotundato; antennis pedibusque multo gracilioribus brevioribusque. Colore supra viridi, thoracis lateribus et humeris cœrulescentibus, tertia parte elytrorum postica paullulum obscurata. 10,5 – 12 millim.

3 ex. — Haut-Orénoque (Gaillard, 1368-1887). Specimina duo altera (♀) jam diu in collectione mea fuerunt : patria « Venezuela »; typus ♀.

Petite espèce qui se rapproche aussi de la *T. annuligera* Luc. et *cribrata* Steinh. Mais ces deux ont un corselet plus long et plus rétréci en arrière (sillons plus profonds!), les épaules plus distinctes, la ponctuation des élytres beaucoup plus serrée, les antennes et pattes évidemment plus longues et plus robustes, etc. Les genoux de l'espèce nouvelle n'ont pas de taches noires.

Odontochila scapularis (Chd. i. l. Catalogue de sa collection, p. 17) : *Od. varianti* Gory similis, differt metathoracis⁽¹⁾ angulo laterali postico (nec episternis!) non punctato, penis apice valde incurvo; labro paullo longiore; thorace vix angustiore; elytrorum impressionibus evidentioribus, macula humerali majore longitudinali marginem aliquantum sequente (nec puncto angulum ipsum occupante!). 9 millim.

2 ♂. — Cayenne (ex. coll. Dejean > Chaudoir).

Quatre premiers articles des antennes, lèvres, cuisses, jambes et trochanters d'un jaune testacé assez pâle. Le front en avant, le bord du corselet (surtout les angles postérieurs) et des élytres d'un vert un peu bleuâtre. Tarses rouge violet; le dessous du corps bleuâtre. La tache humérale est un peu jaunâtre et longe le bord des élytres comme celle de l'*Od. brasiliensis* Dej.

Euryoda Bouvieri : *Eur. exornatæ* Schm. Goeb. (Gestro : Fca!) affinis; labro brevior; fronte thoraceque latioribus, hujus lateribus magis rotundatis, sulcis

⁽¹⁾ Il y a encore trois autres espèces de ce genre qui ont les angles ponctués : *Od. trillyana* Thms., *postica* Chd. et *consobrina*, Luc.

superioribus minus viridinctis; elytris minus elongatis, apice magis oblique truncato, sculptura vix densiore, impressione longitudinali juxta suturam valde distincta: punctis hic fere semper transversim confluentibus; signatura differente: macula media marginali multo minore (vix visibili) et a margine ipso longius distante, puncto altero flavo (discoïdali) majore et magis approximato. Colore supra clarus cupreo (non nitente). 10,5 millim. (sine labro).

♀ ♂. — Lakhon (Harmand, 1878), typus ♂.

Cette espèce possède deux taches jaunâtres au milieu des élytres comme *Eur. exornata* Schm. G., *Goebeli* m. et *heteromalla* M. L., mais ces deux points sont plus rapprochés l'un de l'autre et le latéral est beaucoup plus petit que celui du disque. L'espèce est plus robuste et plus courte que l'*Eur. exornata*, surtout les élytres, qui sont aussi plus ovales.

Cicindela malaris: *C. dimidiaticorni* Luc. simillima; ♂ differt à ♀ magnitudine paullo minore; statura vix graciliore; antico labri margine paullulum emarginato (nec rotundato producto, dente parva mediana excepta); fronte thoraceque angustioribus, hoc basim versus minus lato (marginibus discoque hirsutis); signatura flava lata (grosse punctata); lunula humerali longe in discum prolongata parum curvata cum macula magna totam basim occupante connexa, fascia media sinuata suturam attingente lunula apicali refracta (parte externa breviter prominente, suturali prolongata fere ad finem fasciæ mediæ), margine toto elytrorum flavis. Malis lateribusque inferioribus pilis albis ornatis, abdominis disco nudo. 6 millim.

3 ex. — Pébas: Haut-Amazone (Castelnau, 1847), typus ♂.

Espèce très petite et étroite qui diffère de toutes les formes rapprochées par la pubescence des joues. La sculpture est assez grossière.

LISTE DES ESPÈCES DES GENRES ZONOPTERUS ET PACHYTERIA (COLÉOPTÈRES LONGICORNES) DE LA COLLECTION DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS,

PAR C. RITSEMA Cz.

CONSERVATEUR AU MUSÉE DE LEYDE.

Zonopterus

HOPE. *Trans. Linn. Soc. London*, XIX, 1843, p. 110.

1. FLAVITARSIS Hope. *Trans. Linn. Soc. London*, XIX, 1843, p. 111, tab. X, fig. 7. — Ritsema. *Notes Leyden Museum*, XII, 1890, p. 174.

Une ♀ de Cherra Poonjee.

2. CONSANGUINEUS Ritsema. *Notes Leyden Museum*, XI, 1889, p. 10.

Une ♀ des Indes orientales.